

Bravecto® spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut. Ektoparasitikum für Hunde und Katzen. **Wirkstoff:** Fluralaner 280 mg/ml. **Indikationen:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden und Katzen. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid. Flöhe und Zecken müssen auf dem Wirt anhaften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. **Katze:** anhaltend abtötende Wirkung auf Flöhe (*Ctenocephalides felis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*) über 12 Wochen; bei Hunden eine anhaltend abtötende Wirkung auf Flöhe (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* und *Dermacentor reticulatus*) über 12 Wochen. Die Wirkung bei Flöhen (*C. felis*) beginnt innerhalb von 12 Stunden und bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 48 Stunden nach Anhaftung. **Hunde:** anhaltend abtötende Wirkung auf Flöhe (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*) und Zecken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* und *Dermacentor reticulatus*) über 12 Wochen. Die Wirkung bei Flöhen (*C. felis*) beginnt innerhalb von 12 Stunden und bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 48 Stunden nach Anhaftung. Bravecto® spot-on kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden.

Dosierung/Anwendung: Lösung zum Auftragen auf die Haut. Katzen: 40-94 mg Fluralaner/kg Körpergewicht. Hunde: 25-56 mg Fluralaner/kg Körpergewicht. Zur optimalen Kontrolle eines Floh- und Zeckenbefalls sollte das Tierarzneimittel in Abständen von 12 Wochen verabreicht werden.

Kontraindikationen: Nicht bei Hunden und Katzen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Fluralaner oder einem der Hilfsstoffe anwenden. **Vorsichtsmassnahmen:** Parasiten müssen mit der Nahrungsaufnahme auf dem Wirt beginnen, um gegen Fluralaner exponiert zu werden. Deshalb kann ein Risiko der Übertragung parasitär bedingter Erkrankungen nicht ausgeschlossen werden. Das Tierarzneimittel sollte nicht bei Katzenwelpen unter einem Alter von 11 Wochen und bei Katzen mit einem Gewicht unter 1.2 kg bzw. bei Hundewelpen unter einem Alter von 8 Wochen und bei Hunden mit einem Gewicht unter 2 kg angewendet werden, da entsprechende Daten nicht vorliegen. Das Tierarzneimittel sollte nicht in Abständen unter 8 Wochen angewendet werden, da die Verträglichkeit bei kürzeren Intervallen nicht geprüft wurde. Es ist darauf zu achten, dass der Inhalt der Pipette oder die aufgetragene Dosis nicht in Kontakt mit den Augen des behandelten Tieres bzw. eines anderen Tieres kommt. Nicht direkt auf Hautläsionen auftragen. Hunde innerhalb drei Tagen nach der Behandlung nicht waschen oder schwimmen lassen, damit Fluralaner nicht in Gewässer gelangt und die klinische Wirksamkeit erhalten bleibt. Hunde können drei Tage nach der Behandlung wieder gewaschen/shampooiert werden. Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei trächtigen oder laktierenden Katzen ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt. Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels bei trächtigen und laktierenden Hunden wurde belegt. Kann bei trächtigen und laktierenden Hunden angewendet werden. **Wechselwirkungen:** Keine bekannt. **Unerwünschte Wirkungen:** **Katze:** In klinischen Studien wurden häufig (2.2% der behandelten Katzen) vorübergehende milde Hautreaktionen wie Erythem und Juckreiz oder Alopezie an der Applikationsstelle beobachtet. Folgende weitere Symptome wurden kurz nach der Verabreichung beobachtet: Apathie, Tremor, Anorexie (0.9% der behandelten Katzen) oder Erbrechen, vermehrter Speichelfluss (0.4% der behandelten Katzen). **Hund:** In klinischen Studien wurden häufig (bei 1.2% der behandelten Hunde) milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Erythem und Alopezie an der Applikationsstelle beobachtet. **Abgabekategorie:** B. **Zulassungsinhaber:** MSD Animal Health GmbH, Luzern. **Zusätzliche Informationen:** Siehe Packungsbeilage oder www.tierarzneimittel.ch

Bravecto® spot-on ad us. vet., Solution pour application cutanée. Ectoparasiticide pour chats et chiens. **Principe actif:** Fluralaner 280 mg/ml. **Indications:** Traitement des infestations par les tiques et les puces chez les chats et les chiens. Ce médicament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique. Afin d'être exposées à la substance active, les puces et les tiques doivent être présentes sur l'animal et avoir commencé à se nourrir. **Chats:** Activité insecticide persistante sur les puces (*Ctenocephalides felis*) et activité acaricide persistante sur les tiques (*Ixodes ricinus*) pendant 12 semaines chez les chats. L'effet sur les puces débute dans les 12 heures (*C. felis*) et dans les 48 heures pour les tiques (*I. ricinus*). **Chiens:** Activité insecticide persistante sur les puces (*Ctenocephalides felis* et *Ctenocephalides canis*) et sur les tiques (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* et *Dermacentor reticulatus*) pendant 12 semaines. L'effet sur les puces débute dans les 8 heures (*C. felis*) et dans les 12 heures pour les tiques (*I. ricinus*). Bravecto® spot-on peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP).

Posologie / mode d'emploi: Solution pour application cutanée. Chats: 40-94 mg de fluralaner/kg de poids corporel. Chiens: 25-56 mg de fluralaner/kg de poids corporel. Pour un contrôle optimal de l'infestation par les puces et les tiques, le médicament vétérinaire doit être administré à intervalles de 12 semaines.

Contre-indications: Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au principe actif Fluralaner ou à l'un des excipients. **Précautions:** Pour pouvoir être exposés au fluralaner, les parasites doivent avoir commencé à se nourrir sur l'animal ; par conséquent, le risque de transmission de maladies d'origine parasitaire ne peut être exclu. En l'absence de données disponibles, le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les chatons âgés de moins de 11 semaines et/ou chez les chats dont le poids est inférieur à 1.2 kg et/ou chez les chiens âgés de moins de 8 semaines et/ou chez les chiens dont le poids est inférieur à 2 kg. Le produit ne doit pas être administré à moins de 8 semaines d'intervalle, car l'innocuité pour des intervalles plus courts n'a pas été testée. S'assurer que le contenu de la pipette ou la dose appliquée n'entre pas en contact avec les yeux de l'animal traité ou d'autres animaux. Ne pas administrer aux lésions cutanées. Ne pas laver l'animal et éviter les baignades pendant les trois jours qui suivent le traitement, afin d'empêcher une contamination des eaux par le fluralaner et de préserver l'efficacité clinique. Après trois jours, les chiens peuvent à nouveau être lavés/shampouinés. L'innocuité du médicament chez les chattes reproductrices, gravides ou allaitantes n'a pas été démontrée. N'utiliser qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire traitant. L'innocuité du médicament vétérinaire a été démontrée chez les chiennes reproductrices, gestantes et allaitantes. Peut être utilisé chez les chiennes reproductrices, gestantes et allaitantes. **Interactions:** Aucune connue. **Effets indésirables:** *Chats:* Dans les études cliniques, de légères réactions cutanées transitoires telles qu'érythème, prurit ou alopecie ont été fréquemment observées au site d'application (chez 2.2% des chats traités). Les symptômes suivants ont également été observés peu après l'application: apathie, tremblements, anorexie (0.9% des chats traités) ou vomissements, ptyalisme (0.4% des chats traités). *Chiens:* Dans les études cliniques, de légères réactions cutanées transitoires telles qu'érythème et alopecie ont été fréquemment observées au site d'application (chez 1.2% des chiens traités). **Catégorie de vente:** B. **Titulaire de l'autorisation:** MSD Animal Health SARL, Lucerne. **Informations complémentaires:** Voir notice d'emballage ou sous www.tierarzneimittel.ch.

Bravecto® ad us. vet., Kautablette für Hunde

Wirkstoff: Eine Kautablette enthält Fluralaner (mg); für sehr kleine Hunde (2-4.5 kg) 112.5; für kleine Hunde (>4.5–10 kg) 250; für Hunde mittlerer Grösse(>10–20 kg) 500; für grosse Hunde (>20–40 kg) 1000; für sehr grosse Hunde (>40–56 kg) 1400. **Indikationen:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen, anhaltende zeckenabtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen. Die Wirkung beginnt bei Flöhen (*C. felis*) innerhalb von 8 Stunden, bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 12 Stunden nach Anhaftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. **Dosierung/Anwendung:** Zum Eingeben. Bravecto sollte in einer Dosis von 25-56 mg Fluralaner/kg Körpergewicht peroral zum oder um den Zeitpunkt der Fütterung angewendet werden. Die Kautablette sollte nicht geteilt werden, ausser für die Verabreichung mit dem Futter. **Kontraindikationen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht bei Welpen unter 8 Wochen oder bei Hunden unter 2 kg anwenden. **Vorsichtsmassnahmen:** Parasiten müssen mit der Nahrungsaufnahme auf dem Wirt beginnen, um gegen Fluralaner exponiert zu werden. Deshalb kann ein Risiko der Übertragung parasitär bedingter Erkrankungen nicht ausgeschlossen werden. Da Bravecto Kautabletten aromatisiert sind, besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen die Tablette gezielt aufsuchen und aufnehmen. Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewahren. Bei Hunden mit bekannter Epilepsie mit Vorsicht anwenden. **Unerwünschte Wirkungen:** In klinischen Studien häufig beobachtete Nebenwirkungen (bei 1.6 % der behandelten Hunde) waren milde und vorübergehende gastrointestinale Effekte wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss. In sehr seltenen Fällen wurde in spontanen (Pharmakovigilanz) Berichten von Konvulsionen und Lethargie berichtet. **Abgabekategorie:** B. **Zulassungsinhaberin:** MSD Animal Health GmbH, Luzern. **Zusätzliche Informationen:** Siehe Packungsbeilage oder www.tierarzneimittel.ch

Bravecto® ad us. vet., comprimé à croquer pour chiens

Principe actif: Chaque comprimé à croquer contient Fluralaner (mg): Chiens de très petite taille (2–4.5 kg) 112.5; Chiens de petite taille (> 4.5–10 kg) 250; Chiens de taille moyenne (> 10–20 kg) 500; Chiens de grande taille (> 20–40 kg) 1000; Chiens de très grande taille (> 40–56 kg) 1400. **Indications:** Traitement des infestations par les tiques et les puces chez les chiens. Ce médicament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique qui assure une activité insecticide persistante sur les puces (*Ctenocephalides felis*) pendant 12 semaines, une activité acaricide persistante sur les tiques pendant 12 semaines pour *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* et *D. variabilis* et une activité acaricide persistante sur les tiques pendant 8 semaines pour *Rhipicephalus sanguineus*. L'effet sur les puces débute dans les 8 heures (*C. felis*) et dans les 12 heures pour les tiques (*I. ricinus*). Le produit peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). **Posologie/mode d'emploi:** Pour administration orale. Bravecto® doit être administré à une dose de 25-56 mg de fluralaner/kg de poids corporel au moment ou autour du moment du repas. Les comprimés à croquer ne doivent pas être divisés, sauf pour les administrer avec de la nourriture. **Contre-indications:** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients. Bravecto ne doit pas être utilisé chez les chiots âgés de moins de 8 semaines et/ou chez les chiens dont le poids est inférieur à 2 kg. **Précautions:** Pour pouvoir être exposés au fluralaner, les parasites doivent avoir commencé à se nourrir sur l'animal; par conséquent, le risque de transmission de maladies d'origine parasitaire ne peut être exclu. Les comprimés à croquer Bravecto étant aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats se mettent à leur recherche et les ingèrent en quantités excessives. C'est pourquoi cette préparation doit être gardée hors de portée des animaux. Utiliser avec prudence chez les chiens en cas d'épilepsie préexistante. **Effets indésirables:** Les effets indésirables fréquemment observés lors des essais cliniques (1.6 % des chiens traités) sont des effets gastro-intestinaux légers et transitoires tels que diarrhée, vomissements, inappétence et ptyalisme. Des convulsions et un état léthargique ont été très rarement rapportés dans les déclarations spontanées de pharmacovigilance. **Catégorie de vente:** B. **Titulaire de l'autorisation:** MSD Animal Health SARL, Lucerne. **Informations complémentaires:** Voir notice d'emballage ou sous www.tierarzneimittel.ch